

# ED 診療申込書

さとう美容クリニック

院長 佐藤明男

- 1) 男性の場合、性機能障害とは、性交を行うことが困難な状態のことを意味します。性機能障害には、以下のものに影響する様々な障害が含まれます。性衝動（性欲）、勃起するまたはそれを維持する能力（勃起障害またはインポテンツ）、射精能力、茎の変形なしに勃起する能力、オルガスムに達する能力。ED 薬は陰茎の血管を拡張して勃起する能力を改善する薬です。
- 2) 以下の方はレビトラの服用が禁忌とされています。本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある方（以下の方は処方できません）。硝酸剤或は一酸化窒素（NO）供与剤を服用中の方、主なものは**狭心症、心筋梗塞の薬、ニトログリセリン等**。心血管系障害を有するなど性行為が不適当と考えられる方。**不安定狭心症のある方**、又は性交中に狭心症を起こしたことがある方。**重度の肝障害のある方**。血圧の上が90 mmHg 以下の**低血圧**の方。（治療により管理されていない高血圧の方で安静時に上が170 mmHg 以上、下が100 mmHg 以上の場合）**脳梗塞・脳出血や心筋梗塞の既往歴が最近6ヶ月以内にあった方**。**網膜色素変性症患者の方**。**先天的に不整脈（QT 延長症候群）がある方**。
- 3) **問題がありそうな薬剤**を使用していると思われる方は薬剤名をご記入ください。

( \_\_\_\_\_ )

- 4) 使用経験のある ED 薬に○を付けて下さい。

ない・バイアグラ・レビトラ・シアリス の 10mg・20mg・25mg・50mg

- 5) バイアグラ・レビトラ・シアリスの主な特徴です

	飲食	飲酒	作用時間
バイアグラ	×	×	30分～3時間
レビトラ	○	○	30分～5時間(65歳以上の方は10mg錠)
シアリス	○	○	30分～36時間

- 6) 今回処方を希望されている ED 薬に○を付けて下さい。

1. バイアグラ・レビトラ・シアリス の 10mg・20mg・25mg・50mg を \_\_\_\_\_ 錠

2. バイアグラ・レビトラ・シアリス の 10mg・20mg・25mg・50mg を \_\_\_\_\_ 錠

3. バイアグラ・レビトラ・シアリス の 10mg・20mg・25mg・50mg を \_\_\_\_\_ 錠

内容を十分理解したでの治療を申し込み致します。また、他の ED 薬の処方を希望することがあります。

西暦 202\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

氏名（署名） \_\_\_\_\_